

TRUSA DE URGENȚĂ PENTRU CABINETUL DE MEDICINĂ DENTARĂ

Autori:

Prof.univ.dr.Alexandru Bucur*

Conf.univ.dr.Octavian Dincă*

Ș.l.dr. Cristian Vlădan*

*Clinica de chirurgie OMF, Spitalul Clinic de chirurgie OMF "Prof.dr.D.Theodorescu" București

A. Aparatură și materiale obligatorii

1.	Tensiometru electronic cu măsurare la încheietura mâinii	1 buc.
2.	Feșe 10x10 cm	3 role
3.	Bandă adezivă 5x5 cm	2 role
4.	Soluție polividon-iodat (BETADINE, IODINA, IODOSEPT, POLIODINE) sau clorhexidină (HIBISCRUB, HIBITANE, CLORHEXIN, DESMANOL) pentru tegumente	1 flacon
5.	Seringi 5 ml / 10 ml sterile	5 buc.

B. Medicamente obligatorii

Nr.	DCI (denumirile comerciale sunt listate în paranteză)	Forma farmaceutică	Cantitate	Observații
1.	Nitroglicerină (NITROGLICERINA) sau Nitroglicerină (MAYCOR NITRO SPRAY, NITROMINT)	Cpr. 0,5 mg sau Aerosol 0,4mg/doză	1 cutie (20 cpr.) Atenție la valabilitate (6 luni) !	Se administrează 1 cpr sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAs>100 mg Hg; se poate repetă administrarea la intervale de 5 min (până la 3-4 cpr)
			1 flacon (10 g)	Se administrează 2 pufuri sublingual în criza de angină pectorală, infarct miocardic acut, edem pulmonar acut cu TAs>100 mg Hg; se poate repetă la 5 min.
2.	Nifedipină (ADALAT,CORDIPIN, CORINFAR,NIFEDIPIN, NIFADIL, NIFELAT)	Cpr. 10 mg	1 cutie (10 cpr.)	Se administrează 1 cpr. sublingual, pentru reducerea TA
3.	Acid acetilsalicilic (ASPIRINĂ)	Cpr. 500 mg	10 buc.	Se administrează ½ cp mestecat în cazul suspiciunii de infarct miocardic acut
4.	Enalapril (ENAP)	Cpr. 25 mg	10 buc	Se administrează 1 cpr sublingual pentru reducerea TA; la nevoie se mai poate administra 1 cpr

5.	Adrenalină1:1000 sau Adreanalina1:1000 (EPIPEN, EPIPEN 300) Adrenalină1:2000 (EPIPEN JUNIOR, EPIPEN 150) *	fiole 1mg/1ml sau stick autoinjector 0,3mg (adulti) stick autoinjector 0,15 mg (copii>30 kg)	5 buc. 2 buc. 2 buc.	Se administrează în cazul șocului anafilactic 0,3 ml soluție injectabilă nediluată s.c. / intralingual; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar (până la TA _s > 90 mm Hg) Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar Se administrează în cazul șocului anafilactic, injectându-se o doză i.m.; se poate repeta la 10-15 minute dacă este necesar
* medicament obligatoriu doar în trusa de urgență din dotarea cabinetelor școlare de medicină dentară, conform <i>Ordinului comun al MEN/MS nr.3764/694/2018</i>				
6.	Hidrocortizon Hemisuccinat (FLEBOCORTID, HIDROCORTIZONE, HIDROCORTIZONE NATRIU SUCCINAT)	flacon 100mg sau fiole 25mg	10×100mg 40×25mg	Se administrează i.m. în cazul reacțiilor alergice acute, al crizei de astm bronșic sau al crizei Addisoniene
7.	Prometazină (ROMERGAN) sau Loratadină (CLARITINE) sau Desloratadină (AERIUS) sau Cetirizină (ZYRTEC)	fiole 50mg/2ml cpr.10 mg cpr.5 mg soluție 10mg/ml	5 buc. 5 buc. 5 buc. 1 sticlă	Se administrează i.m. profund o fiolă în cazul reacțiilor alergice acute Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute Se administrează 1 cpr. în cazul reacțiilor alergice acute Se administrează 5 mg (10 picături) în cazul reacțiilor alergice acute
8.	Salbutamol (BUVENTOL, SALBUVENT, VENTOLIN)	spray 100 mcg/doză	1 buc.	Se administrează 1-2 pufuri inhalate oral în caz de criză de astm bronșic
9.	Glucoză 5%	flacon 1000 ml	1 buc.	Se administrează 5-10 ml oral în caz de hipoglicemie
10.	Diazepam	fiole 10 mg/2ml	5 buc.	Se administrează 1 fiolă i.m. în caz de criza convulsivă

11.	<p>Ketorolac (KETOROL, KETRODOL, TORADOL)</p> <p>sau</p> <p>Metamizol (ALGOCALMIN, ANALGIN)</p>	<p>Cpr 10mg</p> <p>Cpr 500 mg</p>	<p>5 buc.</p> <p>5 buc.</p>	<p>Se administrează 1 cpr. oral ca analgetic</p>
12.	Drotavertină (NO-SPA)	Cpr. 40 mg	10 buc	Se administrează 1 cpr. oral ca analgetic la pacienta însărcinată
13.	<p>Amoxicilină (OSPAMOX, DUOMOX, E-MOX, EPHAMOX, MOXILEN) **</p> <p>sau</p> <p>Clindamicină (DALACIN C, CLINDAMICIN, KLINDAN, LANACINE)</p>	<p>Cpr. 500mg</p> <p>Cpr.600 mg</p>	<p>5 buc.</p> <p>5 buc.</p>	<p>Se administrează 2 g oral pentru antibioprofilaxie</p> <p>Se administrează 1 cpr oral pentru antiprofilaxie</p>
** NU se administrează pacienților alergici la peniciline!!				

C. Aparatură facultativă:

- butelie de oxigen cu reductor
- balon de resuscitare
- pipă orafaringiană

Bibliografie:

1. Voroneanu M, Bucur A, Iordache N, Bălan H. Urgențe medico-chirurgicale în cabinetul de medicină dentară, Ed. Medicală, 2011
2. Bucur A, Cioacă R. Urgențe și afecțiuni medicale în cabinetul stomatologic. Editura ETNA București, 2004
3. Asistența medicală Urgentă la etapa de prespital. Nivelul bazal. Ediția a III-a. Northwest Medical Teams, 2005.
4. Medicina de urgență. Ghid pentru studiu comprehensiv. v.1 și 2. Ed. CPSS. București, 2009
5. Arafat R, Vass Hajnal (sub redacția). Primul ajutor calificat. Editura Ministerului Administrației și Internelor, București 2009
6. Stoica V, Scripcaru V. Compendiu de specialități medico-chirurgicale, Ed. Medicală, 2016
7. Harrison. Manual de Medicina, ed.18, Editura All,2014
8. Ghid de management al endocarditei infecțioase al Societății Europene de Cardiologie (ESC). Romanian Journal of Cardiology | Vol. 26, No. 3, 2016
9. Weitz JI, Hirsh J, Samama MM. New antithrombotic drugs: American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest., 2008
10. Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. ACC/AHA 2007 guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines